


Vigilância e Controle de Vetores

“Os vírus são transmitidos através da picada do mosquito infectado das espécies *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. No Brasil, o *Aedes aegypti* está amplamente distribuído em 4.318 municípios, enquanto o *Aedes albopictus* é encontrado em 2.126 municípios”. (*Plano de Contingência para a Introdução do Vírus Chikungunya no Brasil, 2014; pág. 4*).

***No estado do Rio de Janeiro, em 2013,
83 (90,2%) municípios confirmaram, através do LIRAa, a
presença do Aedes aegypti e
73 (79,3%) confirmaram a presença de Aedes albopictus***

Resultado do LIRAa realizado em agosto de 2014, em 60 municípios do Rio de Janeiro.



Fonte: SVS/SES-RJ

Classificação de Risco

| Classificação segundo PNCD | Parâmetro Índice de Infestação Predial | Nº Municípios em relação ao risco | % em relação ao risco | Nº Estratos em relação ao risco | % em relação ao risco |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Satisfatório | < 1% | 43 | 71,7 | 421 | 62,1 |
| Alerta | >= 1% e < 4% | 17 | 28,3 | 252 | 37,7 |
| Alto risco | >= 4% | 0 | 0,0 | 5 | 0,7 |

Criadouros Predominantes

| A1 | | A2 | | B | | C | | D1 | | D2 | | E | |
|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 309 | 7,6 | 1008 | 24,7 | 843 | 20,6 | 858 | 21,0 | 226 | 5,5 | 641 | 15,7 | 203 | 5,0 |

Tipos de Criadouros

A1 = Caixa D'água

A2 = Barril

B = depósitos móveis (prato xaxim, garrafas, latas etc)

C = Depósitos fixos (calhas, laje, ralos etc)

D1 = Depósitos passíveis de remoção/proteção (pneus)

D2 = Depósitos passíveis de remoção/proteção (lixo)

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Assessoria Técnica

Tel.: (21) 2333-4010/3909 fax.: 2333-3884

E-mail: mario.ribeiro@saude.rj.gov.br